

Σε πόσο καιρό θα αρχίσει να δρα η υδροξυχλωροκίνη;

Η υδροξυχλωροκίνη δε δρα αμέσως. Χρειάζεται χρονικό διάστημα του λάχιστον 1 με 2 μήνες μέχρι να παρατηρήσετε κάποια ωφέλεια.

Ποιες είναι οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες;

Συνήθως είναι εξαιρετικά καλά ανεκτή! Οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συνηθισμένες. Σπάνια μπορεί να παρουσιαστεί εξάνθημα στο δέρμα, υπέρχρωση δέρματος, δυσπεπτικά ενοχλήματα, διάρροια, πονοκέφαλο ή διαταραχές στην όραση. Εξαιρετικά σπάνια και μετά από πολλά χρόνια λήψης του φαρμάκου, η υδροξυχλωροκίνη μπορεί να προκαλέσει βλάβη του αμφιβληστροειδή κιτώνα (τμήμα του οφθαλμού). Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες πέραν της υψηλής δόσης είναι η ηλικία (>60 έτη), η χρόνια νεφρική νόσος ή χρόνια ππατική νόσος. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούμε να διακόπτετε την λήψη του φαρμάκου και να επικοινωνείτε με τον θεράποντα Ρευματολόγο σας.



Χρειάζονται ειδικές εξετάσεις ενώ παίρνω την υδροξυχλωροκίνη;

Θα πρέπει να γίνει οφθαλμολογική εξέταση μέσα στο πρώτο έτος έναρξης αγωγής με βυθοσκόπηση. Αν η εξέταση είναι φυσιολογική και δεν έχετε παράγοντες κινδύνου (ηλικία >60 έτη, νεφρική ή ππατική ανεπάρκεια) η βυθοσκόπηση πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 5 έτη. Θα χρειαστεί να κάνετε εξετάσεις αίματος, πριν αρχίσετε να παίρνετε την υδροξυχλωροκίνη, ώστε να ελεγχθεί αν το ήπαρ και τα νεφρά σας λειτουργούν φυσιολογικά. Όμως, δε θα χρειάζεται να κάνετε εξετάσεις αίματος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, ο γιατρός σας χρειάζεται να πληροφορηθεί για οποιαδήποτε προβλήματα όρασης έχετε και θα ελέγχει την όρασή σας πριν να αρχίσετε τη θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη.

Μπορώ να παίρνω άλλα φάρμακα μαζί με την υδροξυχλωροκίνη;

Πολύ λίγα φάρμακα αλληλεπιδρούν με την υδροξυχλωροκίνη. Για παράδειγμα, φάρμακα για δυσπεπτικά ενοχλήματα μπορεί να σταματήσουν την απορρόφηση της υδροξυχλωροκίνης. Αν και τα περισσότερα φάρμακα είναι ασφαλή όταν τα παίρνετε με την υδροξυχλωροκίνη, δε θα πρέπει να παίρνετε φάρμακα χωρίς συνταγή και χωρίς να το συζητήσετε πρώτα με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Επίσης, θα πρέπει πάντα να αναφέρετε σε κάθε γιατρό που σας θεραπεύει το ότι παίρνετε την υδροξυχλωροκίνη.

Μπορώ να μείνω έγκυος ή/και να θηλάσω ενώ παίρνω υδροξυχλωροκίνη;


Η υδροξυχλωροκίνη θεωρείται ασφαλής κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Ελάχιστη ποσότητα του φαρμάκου περνάει στο μητρικό γάλα αλλά αυτό δεν έχει φανεί να επηρεάζει την υγεία του νεογνού. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, ο προγραμματισμός των θεραπειών που λαμβάνετε είναι σημαντικό να συζητείται με τον ιατρό σας.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες για τη θεραπεία σας, τότε θα πρέπει να το συζητήσετε με τον Ρευματολόγο σας

Στο διαδίκτυο:
[https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/Medications/Hydroxychloroquine_\(Plaquenil\)/](https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/Medications/Hydroxychloroquine_(Plaquenil)/)

Θυμηθείτε να φυλάσσετε όλα τα φάρμακα μακριά από τα παιδιά, σε ασφαλές μέρος.



Γιατί μου συνταγογραφούν την υδροξυχλωροκίνη;

Η υδροξυχλωροκίνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και/ή του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (ΣΕΛ). Είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά της ελονοσίας. Στη ρευματοειδή αρθρίτιδα μπορεί να ελαττώσει τη φλεγμονή και έτσι να ελαττώσει τον πόνο, το οίδημα και τη δυσκαμψία των αρθρώσεων. Στον ΣΕΛ βελτιώνει το εξάνθημα στο δέρμα, την αρθρίτιδα και προφυλάσσει από υποτροπές της νόσου.

Πότε πρέπει να παίρνω την υδροξυχλωροκίνη;

Την υδροξυχλωροκίνη πρέπει να την πάρετε κατά τη διάρκεια του φαγητού ή μετά από αυτό.

Τι δόση πρέπει να παίρνω;

Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει για τη δόση που θα παίρνετε. Το χάπι περιέχει 200 mg υδροξυχλωροκίνης. Συνήθως θα αρχίσετε με πλήρη δόση (για παράδειγμα 400 mg υδροξυχλωροκίνης). Αργότερα, αν ο γιατρός σας το κρίνει απαραίτητο μπορεί να τη μειώσει.

Υδροξυχλωροκίνη

(Plaquenil)


ΠΑΝ/ΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

www.rheumatology-uoc.gr



Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης:
Κόσμων 6, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη,
τηλ./fax: 2810 226 966,
email: sylogosreum.crete@gmail.com

www.srcrete.gr



Υδροξυχλωροκίνη

(Plaquenil)

ΠΑΝ/ΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

