

Ποιες είναι οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες;

Από τις συνήθεις παρενέργειες (20%) είναι να αυξήσει την αρτηριακή πίεσην. Επίσης μπορεί να αυξήσει τις τιμές του ουρικού οξέως και της κρεατινίνης στο αίμα.

Σε ορισμένους ασθενείς η κυκλοσπορίνη μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμέτους, διάρροια, αδιαθεσία, κεφαλαλγία, τρόμο και ζάλη. Επίσης μπορεί να προκαλέσει αυξημένη τριχοφυΐα, υπερπλασία των ούλων και αύξηση της χοληστερόλης του αίματος. Η μείωση της δόσης μειώνει ή και εξαφανίζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Όσο λαμβάνετε κυκλοσπορίνη θα πρέπει να προσέχετε την στοματική υγιεινή σας και να μετράτε τακτικά την αρτηριακή πίεσην.

Αν μετά την έναρξη της κυκλοσπορίνης παρουσιάσετε κάποια λοίμωξη, πυρετό, αύξηση της κρεατινίνης στο αίμα, αυξημένη τριχοφυΐα, υπερπλασία των ούλων, αύξηση της αρτηριακής πίεσης και επεισόδια ουρικής αρθρίτιδας ή αν παρουσιάσετε οποιαδήποτε νέα συμπτώματα, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε το Ρευματολόγο σας.

Χρειάζονται ειδικές εξετάσεις ενώ παίρνω την κυκλοσπορίνη;

Θα χρειαστεί να κάνετε τακτικές εξετάσεις αίματος όπως προτείνονται από το γιατρό σας, για όσο χρονικό διάστημα παίρνετε τη κυκλοσπορίνη. Στην αρχή αυτές θα γίνονται πιο συχνά (κάθε 1-2 μήνες για το πρώτο 6μηνο) και μετά εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα επαναλαμβάνονται κάθε 3-4 μήνες. Είναι σημαντικό για την δική σας ασφάλεια η διενέργεια εξετάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Μπορώ να παίρνω άλλα φάρμακα μαζί με την κυκλοσπορίνη;

Η κυκλοσπορίνη μπορεί να χορηγείται μαζί με άλλα φάρμακα που χορηγούνται για άλλες παθήσεις όπως και σε συνδυασμό με άλλα τροποποιητικά των ρευματικών νόσων φάρμακα. Εάν έχετε κάποια αμφιβολία ή απορία συμβουλευτείτε τον Ρευματολόγο σας.

Μπορώ να κάνω εμβόλια ενώ παίρνω την κυκλοσπορίνη;

Θα πρέπει να αποφεύγετε να κάνετε εμβόλια που περιέχουν ζωντανούς μικροοργανισμούς. Τα εμβόλια εναντίον του ιού της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου είναι ασφαλή και συνιστώνται. Σε περίπτωση προγραμματισμένου εμβολιασμού ή εφόσον κριθεί απαραίτητο να κάνετε εμβόλιο με ζώντα μικροοργανισμό επικοινωνήστε με τον Ρευματολόγο σας για περισσότερες οδηγίες.

Μπορώ να λαμβάνω την την κυκλοσπορίνη κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό;

Η κυκλοσπορίνη θεωρείται ασφαλής κατά την κύνηση. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης επικοινωνήστε με τον Ρευματολόγο σας. Για τον θηλασμό υπάρχει οδηγία να αποφεύγεται η χορήγηση της αλλά συμβουλευτείτε τον Ρευματολόγο και τον Παιδίατρο σας για να εκτιμηθεί το πιθανό ρίσκο σε σχέση με το όφελος συνέχισης της θεραπείας.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την κυκλοσπορίνη ή αν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες για τη θεραπεία σας, τότε θα πρέπει να το συζητήσετε με το γιατρό σας.

Θυμηθείτε να φυλάσσετε όλα τα φάρμακα μακριά από τα παιδιά, σε ασφαλές μέρος.



Γιατί μου συνταγογραφούν τη κυκλοσπορίνη;

Η κυκλοσπορίνη χρησιμοποιείται στη θεραπεία αυτοάνοσων νοσημάτων ή και φλεγμονώδων αρθρίτιδων, μεταξύ των οποίων είναι ο Συστηματικός Ερυθυματώδης Λύκος, η Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet, η ψωριασική αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Πότε πρέπει να παίρνω την κυκλοσπορίνη;

Τη κυκλοσπορίνη την λαμβάνετε με τη μορφή χαπιού καθημερινά συνήθως δύο φορές την ημέρα. Δεν πρέπει να καταναλώνετε grapefruit ή χυμό grapefruit όσο λαμβάνετε κυκλοσπορίνη καθώς το grapefruit αυξάνει τις συγκεντρώσεις κυκλοσπορίνης και μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τι δόση πρέπει να παίρνω;

Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει για τη δόση που θα παίρνετε. Η δόση υπολογίζεται από τον ιατρό σας σύμφωνα με το σωματικό σας βάρος και τη νεφρική λειτουργία. Συνήθως ξεκινάτε με μία μικρή δόση και εφόσον δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες αυξάνεται σταδιακά μέχρι την επιθυμητή ημερήσια δόση.

Σε πόσο καιρό θα αρχίσει να δρα η κυκλοσπορίνη;

Η κυκλοσπορίνη δεν δρα αμέσως. Χρειάζεται χρονικό διάστημα 1 έως 2 μήνες μέχρι να παρατηρήσετε κάποια ωφέλεια.

Κυκλοσπορίνη

(Cyclosporin)

(Neoral, Sandimmune, Immunofar,
Sporilen, Restasis)

ΠΑΝ/ΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή


www.rheumatology-uoc.gr



Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης:

Κόσμων 6, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη,
τηλ./fax: 2810 226 966,
email: sylogosreum.crete@gmail.com

www.srcrete.gr



Κυκλοσπορίνη

(Cyclosporin)

(Neoral, Sandimmune, Immunofar,
Sporilen, Restasis)

ΠΑΝ/ΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

