

Ποιες είναι οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες;


Η σουλφασαλαζίνη δεν πρέπει να λαμβάνεται από ασθενείς που έχουν αλλεργία στις σουλφοναμίδες. Σπάνια η σουλφασαλαζίνη μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμέτους, αδιαθεσία, κεφαλαλγία, ζάλη και δερματικά εξανθήματα. Συνήθως αυτές η ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται το πρώτο τρίμηνο της θεραπείας.

Η σουλφασαλαζίνη μπορεί να αυξήσει τα ηπατικά ένζυμα όπως και να επηρεάσει τον αριθμό των κυττάρων του αίματος (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια) και ένα από τα αποτελέσματα είναι η μείωση της παραγωγής τους. Η σουλφασαλαζίνη μπορεί να αλλάξει το χρώμα των ούρων σε έντονο πορτοκαλί και να χρωματίσει φακούς επαφής και δάκρυα. Αυτές η αλλαγές στο χρώμα των ούρων και των δακρύων δεν πρέπει να σας ανησυχούν. Η μείωση της δόσης συχνά εξαφανίζει της ανεπιθύμητες ενέργειες

Αν μετά την έναρξη της σουλφασαλαζίνης παρουσιάσετε κάποια λοίμωξη, πυρετό, πονόλαιμο, ανεξήγητες μελανίες, αιμορραγίες, ή αν παρουσιάσετε οποιαδήποτε νέα συμπτώματα, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε τον Ρευματολόγο σας.

Χρειάζονται ειδικές εξετάσεις ενώ παίρνω την σουλφασαλαζίνη;

Θα χρειαστεί να κάνετε τακτικές εξετάσεις αίματος όπως προτείνονται από το γιατρό σας, για όσο χρονικό διάστημα παίρνετε τη σουλφασαλαζίνη. Στην αρχή αυτές θα γίνονται πιο συχνά και μετά εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα επαναλαμβάνονται κάθε 3-4 μήνες. Είναι σημαντικό για την δική σας ασφάλεια η διενέργεια εξετάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.



Μπορώ να παίρνω άλλα φάρμακα μαζί με την σουλφασαλαζίνη;

Η σουλφασαλαζίνη μπορεί να χορηγείται μαζί με άλλα φάρμακα που λαμβάνετε για άλλες παθήσεις όπως και σε συνδυασμό με άλλα τροποποιητικά των ρευματικών νόσων φάρμακα όπως είναι η μεθοτρεξάτη. Εάν έχετε κάποια αμφιβολία ή απορία συμβουλευτείτε τον Ρευματολόγο σας.

Μπορώ να κάνω εμβόλια ενώ παίρνω την σουλφασαλαζίνη;

Δεν υπάρχει κάποια οδηγία αποφυγής εμβολιασμών ενώ βρίσκεσθε σε αγωγή με σουλφασαλαζίνη

Μπορώ να λαμβάνω την σουλφασαλαζίνη κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό;

Η σουλφασαλαζίνη θεωρείται ασφαλής κατά την κύνοση. Όσον αφορά τον θηλασμό θεωρείται επίσης ασφαλής εκτός των περιπτώσεων που το νεογνό είναι πρόωρο και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νεογνικού ίκτερου. Συμβουλευτείτε τον Παιδίατρο και τον Ρευματολόγο σας σε περίπτωση θηλασμού.

Επιπρεάζει η σουλφασαλαζίνη την γονιμότητα;

Η σουλφασαλαζίνη μπορεί να μειώσει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων στους άνδρες και έτσι να μειώσει προσωρινά την γονιμότητα τους. Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια αναστρέφεται πλήρως με την διακοπή της θεραπείας. Οι άνδρες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν ενώ λαμβάνουν σουλφασαλαζίνη πρέπει να συζητήσουν το θέμα με τον θεράποντα Ρευματολόγο τους

Πρέπει να διακόπτεται η σουλφασαλαζίνη πριν από προγραμματισμένο χειρουργείο;


Η σουλφασαλαζίνη συνίσταται να διακόπτεται 2 ημέρες πριν από το προγραμματισμένο χειρουργείο. Μπορεί όμως και να συνεχίζεται εάν αναμένεται γρήγορη ανάρρωση από το χειρουργείο και δεν αναμένονται αλλολεπιδράσεις με φάρμακα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά την επέμβαση και περιεγχειρητικά. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Ρευματολόγο σας.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε αμφιβολίες για τη θεραπεία σας, τότε θα πρέπει να το συζητήσετε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Στο διαδίκτυο:
[https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/Medications/Sulfasalazine_\(Azulfidine\)/](https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/Medications/Sulfasalazine_(Azulfidine)/)

Θυμηθείτε να φυλάσσετε όλα τα φάρμακα μακριά από τα παιδιά, σε ασφαλές μέρος.



Γιατί μου συνταγογραφούν την σουλφασαλαζίνη;

Η σουλφασαλαζίνη χρησιμοποιείται στη θεραπεία φλεγμονώδων αρθρίτιδων, μεταξύ των οποίων η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα και η εντεροπαθητική αρθρίτιδα.

Πότε πρέπει να παίρνω την σουλφασαλαζίνη;

Τη σουλφασαλαζίνη την λαμβάνετε με τη μορφή χαπιού των 500 mg. Τα χάπια πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα, χωρίς να μασώνται ή να γίνονται σκόνη. Μπορείτε να τα λαμβάνετε πριν όπως και μετά από το φαγητό με ένα ποτήρι νερό.

Τί δόση πρέπει να παίρνω;

Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει για τη δόση που θα παίρνετε. Η δόση είναι 2-3 γραμμάρια ημεροσίως. Δηλαδή 4 με 6 χάπια την ημέρα. Συνήθως ξεκινάτε με 2 χάπια των 500 mg ημεροσίως και εάν δεν υπάρχει δυσανεξία η κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια η δόση αυξάνεται σταδιακά στα 4,5 μέχρι και 6 χάπια την ημέρα. Προτιμάμε να μοιράσουμε την συνολική δόση σε πρωινή και βραδινή, δηλαδή 2-3 χάπια πρωί και τον ίδιο αριθμό το βράδυ.

Σε πόσο καιρό θα αρχίσει να δρα η σουλφασαλαζίνη;

Η σουλφασαλαζίνη δεν δρα αμέσως. Χρειάζεται χρονικό διάστημα 8 έως 12 εβδομάδων μέχρι να παρατηρήσετε κάποια ωφέλεια.

Σουλφασαλαζίνη

(Sulfasalazine) (Salopyrine)

ΠΑΝ/ΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

www.rheumatology-uoc.gr



Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης:
Κόσμων 6, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη,
τηλ./fax: 2810 226 966,
email: sylogosreum.crete@gmail.com

www.srcrete.gr



Σουλφασαλαζίνη

(Sulfasalazine) (Salopyrine)

ΠΑΝ/ΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

